

RAMPICANTI

H. anomala subsp. *petiolaris*

Bellissimo rampicante a foglia decidua, robusto, non ha particolari esigenze in fatto di posizione o terreno e supera freddi anche molto intensi. Adatto ai piedi di grandi alberi (tollera anche la piena ombra), può essere usato anche come tappezzante o contro muri ai quali aderisce con radici aeree. Le infiorescenze sono dei lacecap irregolari, un po' bombati, con bianchi fiori sterili innalzati sopra i fertili color avorio da lunghi peduncoli: questi delicati merletti si aprono in maggio-giugno tra foglie cuoriformi verde tenero e persistono più a lungo in posizioni di mezz'ombra. Il suo denso fogliame si colora in autunno di un caldissimo giallo oro in perfetta armonia con i colori della stagione. E' originaria del Giappone, dove è pressoché ubiquitaria e spontanea in boschi e foreste da livello del mare fino a 2000 m. Da ricordare anche *H. anomala* subsp. *anomala*, molto simile alla sottospecie 'petiolaris' dalla quale differisce solo nel numero di stami dei fiori fertili: si trova spontanea nell'Himalaya orientale e nella Cina centrale ed occidentale fino a 2500 m di altezza.

Altezza: in condizioni ottimali raggiunge i 20 m.

Fioritura: maggio-giugno.

H. anomala subsp. *petiolaris* '**Cordifolia**'

Rampicante a foglia decidua molto simile alla 'petiolaris', ha però rami più sottili e fitti e foglie più piccole. Adatta anche come tappezzante, predilige le posizioni ombrose.

Altezza: raggiunge i 2 m.

Fioritura: fine maggio-luglio.

H. anomala subsp. *petiolaris* '**Tilleifolia**'

Cultivar di *H. anomala* subsp. *Petiolaris* molto simile alla sottospecie tipo sia nel portamento che nel vigore vegetativo: differisce leggermente per le foglie ancora più cuoriformi, che ricordano quelle del figlio. In condizioni ottimali raggiunge i 15 m di altezza. Fioritura da maggio a giugno.

Schizophragma hydrangeoides

Bel rampicante dai rami esili ma folti e dalle infiorescenze lacecap leggermente più grandi della rampicante 'petiolaris' ed interessanti per la presenza di una brattea che diviene simile ad una foglia bianca. Adatto come rampicante o tappezzante, ha radici avventizie che gli permettono di aderire alle superfici. Le foglie cuoriformi sono di un bel verde scuro che ben contrasta con i piccioli e le venature un po' rossastre. Tra le diverse varietà segnaliamo *S. hydrangeoides* 'Roseum' che porta le brattee fiorali di un rosa più o meno intenso a seconda dell'esposizione; predilige la mezz'ombra, ma in climi più freschi ben si adatta anche a posizioni soleggiate.

Altezza: raggiunge i 150 cm.

Fioritura: maggio-giugno.

Schizophragma hydrangeoides var. *roseum*

Varietà della precedente si distingue per le brattee fiorali rosa. Altezza: raggiunge i 10 m. Fioritura: maggio-giugno.

Schizophragma hydrangeoides '**Moonlight**'

Particolare per il colore scuro del suo fogliame con marcate sfumature bianche nella parte compresa fra le nervature della foglia. Questa caratteristica, appena accennata in posizioni molto ombreggiate, si esalta al contrario quando è posta in siti molto luminosi. Infiorescenza relativamente grande, bianca che si tinge di rosa invecchiando.

Altezza: circa 10 metri.

Fioritura: maggio-giugno.